


# Isaspirina

## PREVENTIVA



Aspirina 100 mg

Analgésico. Antiagregante plaquetario

**Fórmula:** Cada comprimido contiene: Ácido acetilsalicílico 100 mg, Almidón de maíz, Povidona, Croscaramelosa sódica, Sacarina sódica, Ciclamato de sodio, Esencia de frutilla, Rojo punzo laca aluminica, Celulosa microcristalina, Estearato de magnesio, Glucosa en polvo. c. s.

**Acción terapéutica:** Analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Antiagregante plaquetario.

**Uso del medicamento:** Lea detenidamente esta información: **ADULTOS:** Previo diagnóstico médico, está indicado en adultos como antiagregante plaquetario para la prevención primaria de un primer infarto en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo, diabetes, hiperlipidemia, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, etc.

**Como usar este medicamento:** Esta presentación se administra por vía oral. Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

**ADULTOS:** Como antiagregante plaquetario un comprimido diario o la dosis sugerida por su médico.

**Advertencias y precauciones:** Este medicamento no debe administrarse a menores de 2 años sin consultar al médico.

Consultar al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días; si se observan empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas consultar al médico inmediatamente.

No administrar en menores de 15 años en caso de SÍNTOMAS DE GRIPE o VARICELA ya que puede incrementar el riesgo de desarrollar SÍNDROME DE REYÉ. Las personas de edad avanzada no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos. Si usted toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas consultar con su médico.

No usar este medicamento en caso de hipersensibilidad conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos; en presencia de trastornos hemorrágicos; en presencia de úlceras gástricas o duodenales, insuficiencia renal y/o hepática.

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico. Si padece asma; diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea; consulte a su médico.

**SI USTED ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, O ESTÁ EMBARAZADA O DANDO DE MAMAR CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE INGERIR ESTE MEDICAMENTO.**

Reacciones adversas: Hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

Interacciones medicamentosas: No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, diuréticos, antianginosas, corticoides. Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

Sobredosis: Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Intoxicaciones. Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247, Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 Centro de Asistencia Toxicológica La Plata - Tel.: (0221) 451-5555.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud - Cert. N° 50958 - Revisión; 03/2012

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Conservación: Conservar en sitio fresco (temperatura no mayor de 30° C) y al abrigo de la humedad.

Instituto Seroterápico Argentino SAIC - Av. Larrazábal 1848/50 - CABA

Elaborado en: Remedios 5776 - CABA - Director Técnico: Ariel Correa - Farmacéutico.