

# Serocutina

+ **Cicatrizante** **Crema**  
+ **Regeneradora de la piel**

**Acción terapéutica:** Cicatrizante y regeneradora de la piel.

**Indicaciones:** Indicada en caso de dermatitis, especialmente en dermatitis de la zona del pañal, en escaldaduras, paspaduras, quemaduras leves de escasa extensión.

**Posología - modo de administración:** En la dermatitis de la zona del pañal, aplicar la crema Serocutina posterior a cada cambio del mismo. En escaldaduras, paspaduras y quemaduras leves de escasa extensión, aplicar 2 a 3 veces diarias. El período de tratamiento debe ser no mayor de 5 días. En caso de no mejorar o empeorar los síntomas, consultar al médico.

**Modo de conservación:** conservar a temperatura ambiente preferentemente entre los 15° y 30°C.

**Fórmula cuali-cuantitativa: Cada 100 gramos contiene:**

Vitamina A (como Vitamina A palmitato)	100.000 U.I.
Óxido de zinc	15 g
Benzocaina	0.500 g
Ácido Bórico	2 g
Cloruro de benzalconio	0.010 g
Talco	15 g
Lanolina	28 g
Vaselina	28 g
Vaselina líquida	11.2 g
Vainillina	0.04 g

**Contraindicaciones:** En casos de reconocida hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

**Advertencias y precauciones:** Uso externo. Si los síntomas, malestar o dolencia empeoran o persisten por más de 5 días, consulte a su médico. En caso de estar tomando algún medicamento, en caso de embarazo ó lactancia, consulte a su médico.

**Efectos adversos:** La vitamina A puede absorberse a través de la piel, pudiendo provocar toxicidad, especialmente en los niños. Signos de sobredosis aguda son: hemorragia gingival, somnolencia, visión doble, cefalea severa, irritabilidad severa, descamación de la piel y vómitos severos. Signos de sobredosis crónica son: artralgias, desecación o agrietamiento de la piel, fiebre, anorexia, alopecia, cansancio, vómitos, hipomenorrea y máculas de color amarillo naranja en la planta de los pies, palma de las manos o en la piel que rodea la nariz y los labios. La toxicidad revierte lentamente con la suspensión del tratamiento, pero los signos pueden persistir por varias semanas.

**Sobredosificación:** Ante la eventualidad de una sobredosificación o en caso de ingestión accidental, concurra al Hospital más cercano o comuníquese con alguno de los siguientes Centros de Toxicología: HOSPITAL ALEJANDRO POSADAS: (011)4954-6648 ó (011)4658-7777  
HOSPITAL DE PEDIATRÍA R. GUTIERREZ: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 55041 - Director Técnico: Ariel Oscar Correa - Farmacéutico  
**INSTITUTO SEROTERÁPICO ARGENTINO SAIC** - Avenida Larrazábal 1848 - Capital Federal  
Elaborado en: Coronel Méndez 440 - Wilde - Provincia de Buenos Aires