



GlucoCartiflex

VL

Antiartrósico

Glucosamina 1500

Fórmula cualicuantitativa:

Cada sobre monodosis de 3,95 gr. contiene:

Glucosamina sulfato (como glucosamina sulfato policristalina)	1500mg.
Aspartame	2,50mg.
Acido cítrico	25mg.
Glucosa anhidra c.s.p.	3950mg.

Venta Libre

Acción Terapéutica: Antiartrósico.

Indicaciones: Está indicado para ser utilizado previo diagnóstico médico para el tratamiento complementario de procesos degenerativos con deterioro de la función articular de origen artrósico.

Para el uso del medicamento, lea detenidamente esta información:

Acción Farmacológica: Glucosamina sulfato, es un factor necesario para la biosíntesis de sustancias que juegan un rol importante en la formación de las superficies articulares, ligamento, piel, hueso.

En la artrosis se ha verificado una disminución y/o ausencia local de Glucosamina.

Posología: 1 sobre por día junto con las comidas. Se aconseja continuar el tratamiento por un lapso de seis semanas, luego de transcurrido ese período puede repetirse el tratamiento realizando un descanso de 2 meses.

Luego de consultar con un médico para evaluar la necesidad de continuar con el tratamiento.

Modo de preparación: Volcar el contenido de un sobre en un vaso conteniendo unos 200 cc.de agua. Agitar hasta disolver completamente

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula embarazo, lactancia, fenilcetonuria, insuficiencia renal severa.

Precauciones y Advertencias: Administrar con cautela en pacientes afectados por úlcera péptica o en pacientes tratados con diuréticos.

Si Ud. esta tomando algún medicamento, está embarazada, o en período de lactancia, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento

Interacciones Medicamentosas: Si Ud. se encuentra tomando: tetraciclinas, penicilina o cloramfenicol, deberá consultar al médico antes de utilizar el producto

Reacciones Adversas: Ocasionalmente pueden presentarse reacciones alérgicas dérmicas.

Eventualmente molestias gastrointestinales, como dolor epigástrico, náuseas y/o diarrea, acidez, dispepsia, vómitos y constipación.

Si los síntomas de malestar gastrointestinal persisten más de 24 horas, consulte a su médico.

Sobredosificación: No se han reportado casos de sobredosis no tratada con el uso del producto.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011)4654-6648/4658-7777

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o Farmacéutico.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud - Cert.Nº51224

Todo medicamento debe permanecer fuera del alcance de los niños.

Conservación: En su envase original a temperatura ambiente, no mayor de 30°C, al abrigo de la acción directa de la luz solar y al abrigo de la humedad.

Fecha de última revisión: 7/06/2004

Instituto Seroterápico Argentino SAIC

Avenida Larrazábal 1848/50- Cap. Fed.

Elaborado en: Remedios 5772 - Capital Federal.

Director Técnico: Ariel Correa - Farmacéutico